

من أجل تقليل خطر النزيف والتجلط، من المهم حضور مواعيد المتابعة مع مقدم الرعاية لك وإجراء فحوصات الدم وفقًا لأوامره.

ما هو أبيكسابان (إليكويس)؟

- يُطلق على أبيكسابان اسم إليكويس أيضًا
- يُستخدم أبيكسابان (إليكويس) لتقليل خطر الإصابة بجلطات دموية والسكتة الدماغية لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب المعروف باسم الرجفان الأذيني أو الذين أصيبوا بجلطة دموية أو خضعوا لجراحة العظام.
 - قد تسد الجلطات الدموية أحد الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انقطاع تزويد المنطقة بالدم.
 - وفي حالات نادرة، يمكن أن تتفتت الجلطات إلى أجزاء وتنتقل في مجرى الدم، وتستقر في القلب (مسببة أزمة قلبية) أو في الرئتين (مسببة صمة رئوية) أو في الدماغ (مسببة سكتة دماغية).

إليكويس
أقراص 5 مجم و2.5 مجم



- إذا كنت تستخدم وارفارين/كوماتدين سابقًا وتبدأ باستخدام أبيكسابان (إليكويس)، فاحرص على عدم الاستمرار في تناول الوارفارين. يحل أبيكسابان (إليكويس) محل الوارفارين/الكوماتدين.

كيف أتناول أبيكسابان (إليكويس)؟

- تناول أبيكسابان (إليكويس) حسبما يصف طبيبك.
- يمكن تناول أبيكسابان (إليكويس) مع الطعام أو بدونه.
- إذا فاتتك جرعة:
 - فخذها فور تذكرها في اليوم نفسه. لا تضاعف الجرعة لتعويض الجرعة الفائتة.
- لا تتوقف عن تناول أبيكسابان (إليكويس) فجأة دون إخبار طبيبك. قد يؤدي ذلك إلى تعرضك لخطر الإصابة بسكتة دماغية أو جلطة دموية.
- إذا تناولت أبيكسابان (إليكويس) بإفراط شديد، فاتصل بطبيبك أو بخدمة منع التجلط. إذا كنت تعاني من أي نزيف لا يمكنك إيقافه، فاجأ إلى أقرب غرفة طوارئ.

MAQI2 (Michigan Anticoagulation Quality Improvement Initiative)
Apixaban (Eliquis®)

كيف أخزن أبيكسابان (إليكوييس)؟

- خزنه في درجة حرارة الغرفة في مكان جاف (تجنب تخزينه في الحمام).

ما الذي ينبغي معرفته عن أبيكسابان (إليكوييس)؟

- يمكن أن يعمل أبيكسابان (إليكوييس) على زيادة خطر الإصابة بنزيف لأنه يقلل من قدرة الجسم على التجلط. أثناء تناول أبيكسابان (إليكوييس)، قد تظهر عليك آثار الرضوض بسهولة أكبر وقد يستغرق توقف النزيف وقتاً أطول.
- يمكن أن يتسبب أبيكسابان (إليكوييس) في نزيف قد يشكل خطورة. وقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بنزيف إذا كنت تتناول أبيكسابان (إليكوييس) إلى جانب:
 - تجاوز عمرك 75 عامًا
 - إصابتك بمشكلات في الكلى
 - المعاناة من نزيف حديث أو متكرر في المعدة أو الأمعاء أو قرحة في المعدة.
 - تناول أدوية أخرى تعمل على زيادة خطر الإصابة بنزيف، منها:
 - الأسبرين أو المنتجات التي تحتوي على الأسبرين
 - الاستخدام الطويل الأمد لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، بما فيها الإيبوبروفين والنابروكسين.
 - كلوبيدوجريل (بلافيكس) أو براسوجريل (إيفينت) أو تيكاجريلور (بريلينتا)
 - أي دواء يحتوي على الهيبارين

ما هي الآثار الجانبية المحتملة لتناول أبيكسابان (إليكوييس)؟

- يمكن أن يعمل أبيكسابان (إليكوييس) على زيادة خطر الإصابة بنزيف لأنه يقلل من قدرة الجسم على التجلط. أثناء تناول أبيكسابان (إليكوييس)، قد تظهر عليك آثار الرضوض بسهولة أكبر وقد يستغرق توقف النزيف وقتاً أطول.
- قد يسبب أبيكسابان (إليكوييس) لدى بعض الأشخاص أعراض ناتجة عن رد فعل تحسسي، تتضمن الشرى والطفح الجلدي والحكة. اطلب العناية الطبية فوراً إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية الناتجة عن رد فعل تحسسي خطير:
 - ألم أو ضيق في الصدر
 - تورم في الوجه أو اللسان أو صعوبة في التنفس أو أزيز أو الشعور بالدوار أو الإغماء

مركز فرانكل للقلب والأوعية الدموية (Frankel Cardiovascular Center)

أبيكسابان (إليكوييس)

- 2 -

MAQI2 (Michigan Anticoagulation Quality Improvement Initiative)

Apixaban (Eliquis®)

متى ينبغي الاتصال بالطبيب أو بخدمة منع التجلط؟

- إذا بدأت تناول أي أدوية أو توقفت عن تناول أي منها، بما في ذلك الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية أو المكملات العشبية. قد تؤثر تلك الأدوية والمكملات على نتيجة العلاج بتناول أبيكسابان.
- عند الخضوع لعملية جراحية أو إجراء جراحي، حيث قد يلزم التوقف عن تناول أبيكسابان لفترة زمنية قبل إتمام الإجراء. لا تتوقف عن تناول أبيكسابان (إليكويس) بدون استشارة طبيبك أولاً.
- عند الحاجة إلى عبوة دوائية جديدة (يُنصح بالإبلاغ عن عدم توفر علاج أبيكسابان قبل نفاذه لديك).
- إذا تعذر تحمل تكلفة علاج أبيكسابان:
- إذا كنت تعاني من أي نزيف غير متوقع أو نزيف مستمر لفترة طويلة، في حالات مثل:
 - نزيف غير معتاد من اللثة
 - نزيف الأنف في كثير من الأحيان
 - نزيف حيضي أو مهبطي أكثر غزارة من المعتاد
 - رضوض تظهر دون سبب معروف أو تتفاقم

متى يجب طلب المساعدة الطبية الطارئة؟

اتصل بالرقم 911 فوراً إذا واجهت أيًا من الحالات الخطيرة التالية:

- إذا واجهت أيًا من علامات النزيف وأعراضه التالية:
 - نزيف شديد أو يتعذر التحكم فيه
 - بول وردي أو بني اللون
 - براز أحمر أو أسود اللون (يشبه القطران)
 - سعال مصحوب بدم أو جلطات دموية
 - تقيؤ دموي أو إذا كان القيء يشبه "ثفل القهوة"
- إذا واجهت أيًا من علامات السكتة الدماغية وأعراضها التالية:
 - دوام أو فقدان مفاجئ للرؤية أو صداع شديد مفاجئ
 - تنميل أو ضعف في أي طرف
 - صعوبة أو تداخل في الكلام
 - تدلي أحد جانبي الوجه

مركز فرانكل للقلب والأوعية الدموية (Frankel Cardiovascular Center)

أبيكسابان (إليكويس)

- 3 -

MAQI2 (Michigan Anticoagulation Quality Improvement Initiative)

Apixaban (Eliquis®)

- إذا واجهت أيًا من علامات الجلطات الدموية وأعراضها التالية:
 - ضيق مفاجئ شديد في التنفس وألم في الصدر
 - تورم أو احمرار أو حرارة أو ألم في أي طرف

إخلاء للمسؤولية: تحتوي هذه الوثيقة على معلومات و/أو مواد إرشادية طورتها كلية الطب بجامعة ميشيغان (Michigan Medicine) للمرضى المعتادين المصابين بنفس حالتك. وقد تحتوي على روابط لمحتوى على الإنترنت لم تنشئه كلية الطب بجامعة ميشيغان (Michigan Medicine) ولا تتحمل مسؤوليته. وهذه الوثيقة لا تحل محل النصيحة الطبية من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لأن تجربتك قد تختلف عن تجربة المريض المعتاد. استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه الوثيقة، أو حالتك أو خطة علاجك.

الكاتبة: Elizabeth Renner, PharmD
المراجعون: Nghi Ha, PharmD & Erin Mouland, PharmD

تنقيف المريض من قبل [كلية الطب بجامعة ميشيغان \(Michigan Medicine\)](#) مرخص بموجب ترخيص
[Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](#) العام. آخر مراجعة بتاريخ 07/2019

مركز فرانكل للقلب والأوعية الدموية (Frankel Cardiovascular Center)
أبيكسابان (إليكويس)

- 4 -

MAQI2 (Michigan Anticoagulation Quality Improvement Initiative)
Apixaban (Eliquis®)